

Trimetoprim Recip 100 mg tabletter, Trimetoprim Recip 160 mg tabletter, Trimetoprim Recip 300 mg tabletter

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

Vad innehåller Trimetoprim Recip?

1 tablett innehåller:

Verksamt ämne: trimetoprim 100 mg, 160 mg respektive 300 mg.

Övriga innehållsämnen: magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa, potatis-stärkelse.

Övriga innehållsämnen finns med för att tabletterna ska gå att tillverka.

Hur verkar Trimetoprim Recip?

Trimetoprim Recip minskar bakteriernas förmåga att bilda ett enzym som är nödvändigt för deras produktion av folsyra. Bakterierna kan då inte föröka sig och kvarvarande bakterier dör.

Information lämnas av/Innehavare av försäljningstillstånd

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00

Vad används Trimetoprim Recip mot?

Trimetoprim Recip används mot mindre allvarliga urinvägsinfektioner.

Trimetoprim Recip används även i förebyggande syfte vid återkommande urinvägsinfektioner.

När ska Trimetoprim Recip inte användas?

Du ska inte använda Trimetoprim Recip om du är överkänslig för trimetoprim eller för något övrigt innehållsämne. Trimetoprim Recip ska inte heller användas av om du har svåra leverskador eller blodsjukdom med störd cellfunktion i blodet (bloddyskrasi).

Detta ska du tänka på innan och när Trimetoprim Recip används

Om du har allvarlig njurskada ska du rådgöra med läkare innan behandling med Trimetoprim Recip påbörjas. Trimetoprim Recip kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tala därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Trimetoprim Recip under graviditet.

Amning

Trimetoprim passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Trimetoprim Recip under amning.

Trafik och maskiner

Det finns inget som tyder på att Trimetoprim Recip påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Påverkan av andra läkemedel

Tala om för läkaren om du använder andra läkemedel samtidigt som du tar Trimetoprim Recip. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Trimetoprim Recip till exempel läkemedel mot

- blodpropp (warfarin)
- diabetes (glibenklamid)
- epilepsi (fenytoin)
- avstötning av transplanterat organ (ciklosporin)
- tuberkulos (rifampicin)
- HIV-virusinfektion (zidovudin)

Effekten av p-piller kan påverkas av behandlingen med Trimetoprim Recip.

Doseringsanvisning

Din läkare bestämmer **dosen** så att den passar för dig. Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Trimetoprim Recip-kuren fullföljs enligt **ordinationen**. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av **infektionen**.

Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor **dos** läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Biverkningar

Biverkningar kan förekomma men det är inte säkert att du får någon av dem.

Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Illamående, kräkningar, hudutslag, **klåda**, **inflammation** i tungan.

Mindre vanliga: Nässelutslag, blodpåverkan

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Feber, **hjärnhinneinflammation**, diarré, **inflammation** i tjocktarmen, känslighet för solljus, **bindhinneinflammation** i ögat, **blodbildsförändringar** till exempel **agranulocytos**, hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga).

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

Avbryt behandlingen och kontakta läkare:

- vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad.
- om du får en **infektion** eftersom det kan vara **agranulocytos**, se ”Detta ska du tänka på innan och när Trimetoprim Recip används”.

Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.

Förvaring och hållbarhet

Användes före det utgångsdatum som står på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revision. 2008-11-01